trigos

TRIGO

NUEVO

DM ARAUCARIA

CICLO INT. LARGO

Calidad: BUENA

Escaneá el QR para más información

DONMARIO SEMILLAS

RH

RE

SEP

MA

FUS

Erecto

VE



Z 6.0

Z 9.0

95 cm[2]

118[1]

42[1]

Programa I+D Barraca Erro // [1]Para una fecha de siembra 17/5/2024 - Dolores // [2]INIA-INASE 2022

TRIGO

DM PEHUEN

CICLO INTERMEDIO

Escaneá el QR
para más información

DONMARIO SEMILLAS

Calidad:
BUENA

RH
RE
SEP
MA
FUS

Semierecto

88 cm(2)

VE

Z 6.0

Z 9.0

110(1)

44(1)

Programa I+D Barraca Erro // (1)Para una fecha de siembra 30/5/2024 - Dolores // (2)INIA-INASE 2020.

TRIGO

DM CATALPA

CICLO INTERMEDIO

Escaneá el QR
para más información

Calidad:
EXCELENTE

URUTRIGO

DONMARIO SEMILLAS

RH
RE
SEP
MA
FUS

Semierecto

96 cm(2)

VE

Z 6.0

Z 9.0

109(1)

44(1)

Programa I+D Barraca Erro // (1)Para una fecha de siembra 30/5/2024 - Dolores // (2)INIA-INASE 2022.

TRIGO

DM AROMO

CICLO CORTO

Escaneá el QR
para más información

DONMARIO SEMILLAS

Calidad:
BUENA



Programa I+D Barraca Erro // (1)Para una fecha de siembra 17/6/2024 - Dolores // (2)INIA-INASE 2022.

TRIGO

DM AUDAZ TBio

CICLO CORTO

Calidad: EXCELENTE

URUTRIGO

Escaneá el QR para más información

DONMARIO SEMILLAS

RH
RE
SEP
MA
FUS

Erecto



88 cm(2)

VE

93(1)

Z 6.0

34(1)

Z 9.0

Programa I+D Barraca Erro // (1)Para una fecha de siembra 17/6/2024 - Dolores // (2)INIA-INASE 2018.

FECHA DE SIEMBRA





colzas invernales

Escaneá el QR
para más información

DSV

BEATRIX CL

CICLO INVERNAL

TECNOLOGÍAS

PSR | CL | TuYV | RLM7+



(1)Fecha de siembra promedio 31 de Marzo INIA-INASE 2021/22/23.

Clearfield

COLZA INVERNAL

COLZA *INVERNAL*

DUKE

CICLO INVERNAL

Escaneá el QR para más información

DSV

TECNOLOGÍAS

PSR | TuYV | RLM7+



(1)Fecha de siembra promedio 31 de Marzo INIA-INASE 2021/22/23.

colzas primaverales

COLZA PRIMAVERAL

LANZAMIENTO

APOLO CL

CICLO LARGO

Clearfield

TECNOLOGÍAS

PSR CL RLM7+

Escaneá el QR para más información

DSV

(1)Fecha de siembra de 10/04/24, Programa I+D ERRO. // (2) INIA-INASE 2022/23/24.

COLZA *PRIMAVERAL*

Clearfield
Sistema de Producción

CURRY CL

CICLO *LARGO*

Escaneá el QR para más información

DSV

TECNOLOGÍAS

CL



(1)Fecha de siembra de 10/04/24, Programa I+D ERRO. // (2) INIA-INASE 2020/21/22.

HYOLA 575 CL

COLZA PRIMAVERAL

TECNOLOGÍAS

CL

CICLO INTERMEDIO

Escaneá el QR
para más información

ADVANTA



(1)Fecha de siembra de 15/05/24, Programa I+D ERRO.

Clearfield Sistema de Producción

COLZA *PRIMAVERAL*

Clearfield
Sistema de Producción

NUEVA

EQUINOX CL

CICLO *INT. CORTO*

Escaneá el QR para más información

ADVANTA

TECNOLOGÍAS

CL



(1)Fecha de siembra 15/05/24 - DOLORES // (2) INIA - INASE 2022/24

COLZA PRIMAVERAL

NUEVA

HYOLA 130

CICLO INT. CORTO

Escaneá el QR
para más información

ADVANTA

(1)Fecha de siembra 15/05/24 - DOLORES // (2) INIA - INASE 2022/23/24

COLZA *PRIMAVERAL*

Clearfield
Sistema de Producción

LANZAMIENTO

CONTINUUM CL

CICLO *INT. CORTO*

Escaneá el QR para más información

ADVANTA

TECNOLOGÍAS

CL

(1)Fecha de siembra 15/05/24 - DOLORES // (2) INIA - INASE 2022/23/24

FECHA DE SIEMBRA

COLZA	CICLO	POB. REC. pl/m²
BEATRIX CL	INVERNAL	35 - 45
DUKE	INVERNAL	35 - 45
LANZA. APOLO CL	PRIMAVERAL LARGO	50 - 60
CURRY CL	PRIMAVERAL LARGO	50 - 60
HYOLA 575 CL	PRIMAVERAL INTERMEDIO	60 - 70
NUEVA EQUINOX CL	PRIMAVERAL INTERMEDIO / CORTO	60 - 70
NUEVA HYOLA 130	PRIMAVERAL INTERMEDIO / CORTO	60 - 70
LANZA. CONTINUUM CL	PRIMAVERAL INTERMEDIO / CORTO	60 - 70

semillas forrajeras

AVENA ESTANZUELA 1095a

- Byzantina.
- Tipo amarillo.
- Adaptada a siembras muy tempranas.
- Aporta forraje temprano en el otoño.
- Muy buena adaptación al pastoreo.

Caracteríscas Agronómicas

Excelente capacidad de macollaje y rebrote después de los pastoreos.
Muy buen rendimiento en otoño.
Tiene muy buen vigor inicial y excelente implantación en un amplio rango de épocas de siembra.
La densidad de siembra recomendada va entre 90 y 100 kg/ha y en siembras de principios de Febrero se recomienda sembrar a 90 kg/ha.

GENETICA INIA URUGUAY

ERRO SEMILLAS

FORRAJERAS

AVENA IAPAR 61

- Strigosa.
- Múltiples propósitos.
- Rápido crecimiento inicial.
- Hábito intermedio.

Caracteríscas Agronómicas

Su ciclo tardío posibilita un mayor número de pastoreos, aumentando la producción de forraje y prolongando el período de cobertura del suelo.
La densidad de siembra recomendada va entre 45 y 55 kg/ha.
Excelente comportamiento sanitario y producción muy temprana de forraje.

ERRO SEMILLAS

NUEVA

AVENA FRONTEIRA

GENÉTICA SUPERIOR

- Tipo Sativa.
- Seleccionada en Rio Grande do Sul, Brasil.
- Admite siembras muy tempranas (fines de enero y febrero).
- Destacado comportamiento frente a roya de la hoja.

Caracteríscas Agronómicas

Avena muy apta para el manejo de múltiples pastoreos, con una alta producción de forraje total y destacada producción otoñal.
Se recomienda sembrar a una densidad de entre 60 y 70 kg/ha. con el objetivo de pastoreo, en el caso de usarla como puente verde se puede bajar la densidad a 50 kg/ha.

Pasture Genetics

ERRO SEMILLAS

FORRAJERAS

RAIGRÁS ESTANZUELA 284

- Tipo Westerwoldicum.
- Diploide.
- Muy buena producción de otoño-invierno.
- Amplia adaptación a la región.

Caracteríscas Agronómicas

Es estrictamente anual de ciclo corto.
Florece a fines de setiembre. Se adapta a muchos tipos de suelo en todo el país y su productividad depende del nivel de fertilidad.
Posee una alta respuesta al nitrógeno.
Se recomienda sembrarlo a partir de los primeros días de marzo.
Lo recomendado en cuanto a densidad de siembra es entre 20 y 25 kg/ha.
La producción de forraje de Estanzuela 284 se maximiza con pastoreos rotativos cuando alcanza 18-20 cm de altura, pero tolera bien manejos más frecuentes.

GENETICA INIA URUGUAY

ERRO SEMILLAS

RAIGRÁS PG CHIEF

- Tetraploide de ciclo medio.
- Mejoramiento local.
- Excelente capacidad de rebrote post pastoreo.
- Muy alta producción de otoño e invierno.

Caracteríscas Agronómicas

Raigrás Tetraploide de ciclo medio, buena adaptación a sistemas de pastoreo que requieren altas producciones de forraje en los meses de Noviembre y Diciembre. Se recomienda sembrar a mediados de Marzo con una densidad de entre 20 y 25 kg/ha.

Pasture Genetics

ERRO SEMILLAS

FORRAJERAS

DACTYLIS LE OBERON

- Tardio de Floración Fines de octubre.
- Habito semierecto con buen vigor inicial.
- Adaptado a la región.

Caracteríscas Agronómicas

Es un cultivas sintético seleccionado por su alta producción otoño - invernal, sanidad foliar y persistencia.
Se adapta a un amplio rango de suelos, pero se destaca su producción en suelos de texturas medias y permeables.
Tiene buena resistencia a períodos con restricción hídrica y es menos exigente en fertilidad y humedad que la festuca. Se recomienda su siembra a partir de mediados de marzo con una densidad de 6 a 10 kg/ha.

GENETICA INIA URUGUAY

ERRO SEMILLAS

FESTUCA TACUABÉ

- Tipo Continental.
- Temprana, florece proximo al 13/9.
- Produce forraje todo el año.
- Muy buena adaptación.

Caracteríscas Agronómicas

Es una festuca temprana que encaña a mediados de setiembre y si bien puede producir forraje todo el año tiene un pico de producción en setiembre y otro menor en otoño.
Salvo en suelos arenosos, crece muy bien en suelos medios, pesados y húmedos.
Debe sembrarse a partir de mediados de marzo utilizando como mínimo densidades de 18 a 20 kg/ha.

GENETICA INIA URUGUAY

ERRO SEMILLAS

FORRAJERAS

LOTUS SAN GABRIEL

- Corniculatus.
- Excelente adaptación al pastoreo.
- Comprobada versatilidad y amplia adaptación ambiental.
- Buen comportamiento en suelos con bajos niveles de fósforo.

Caracteríscas Agronómicas

Es un cultivar versátil que puede incluirse en todas las mezclas forrajeras.
Se combina muy bien con gramíneas perennes, cebadilla y raigrás anual, ya sea como única leguminosa de la mezcla o en combinación con trébol blanco y alfalfa.
La densidad de siembra recomendada es de entre 5 a 8 kg/ha, la fecha recomendada de siembra es a mediados del mes de marzo.
Tiene buena estabilidad productiva en diferentes ambientes agroecológicos, con excepción de los suelos superficiales.
Tolera situaciones de mal drenaje pero no anegamiento prolongado.

GENETICA INIA URUGUAY

ERRO SEMILLAS

TRÉBOL BLANCO ESTANZUELA ZAPICÁN

- Hoja grande, erecto.
- Floración temprana.
- Rápido establecimiento.
- Alta producción invernal.
- Muy buena adaptación a la región.

Caracteríscas Agronómicas

Sus cualidades más destacadas son su rápido establecimiento y excelente producción invernal.
Tiene abundante semillazón que asegura un banco de semillas adecuado para los años de buena resiembra.
Se adapta bien a suelos de texturas medias a pesadas y especialmente a mejoramientos de bajos.
Dependiendo del tipo de mezcla, se aconseja utilizar densidades de 1 a 3 kg/ha.
Se recomienda sembrar al inicio del otoño, desde mediados de marzo.
Requiere un buen nivel de fósforo (12-15 ppm Bray I) para mostrar su potencial.

GENETICA INIA URUGUAY

ERRO SEMILLAS

FORRAJERAS

ALFALFA CHANÁ

- Tipo Latencia Intermedia.
- Rápida implantación y alta producticidad en el primer año.
- Recomendada para rotaciones largas en tambos.

Caracteríscas Agronómicas

Se destaca por tener muy buena productividad durante todo su ciclo de crecimiento, pudiendo producir hasta 50% del forraje total en el verano.
Buena resistencia a enfermedades foliares.
La rápida recuperación permite obtener seis cortes o pastoreos al año.
Se recomienda sembrar a mediados de Marzo con una densidad de siembra de entre 15 y 20 kg/ha.
Si se opta por sembrar en meses de primavera como Setiembre no usar menos de 20 kg/ha.

GENETICA INIA URUGUAY

ERRO SEMILLAS

TRÉBOL ROJO ESTANZUELA 116

- Sin latencia.
- Destacada adaptación al pastoreo.
- Alta producción de forraje en otoño-invierno.
- Porte erecto y ciclo corto.

Caracteríscas Agronómicas

Posee una destacada precocidad y alta producción total e invernal, característica que lo diferencia de los cultivares con latencia, aún de los más productivos.
Su pico de máxima producción se presenta en noviembre.
Su vida productiva es de dos años, con eventuales aportes de forraje en la tercer primavera.
Se recomienda sembrar a mediados de Marzo con densidades entre 5 y 8 kg/ha, va depender de si se siembra puro o asociado a una gramínea.

GENETICA INIA URUGUAY

ERRO SEMILLAS

FORRAJERAS

TRÉBOL ROJO PG BAQUEANO

- Variedad diploide sin latencia invernal.
- Destacada persistencia.
- Muy alta producción de forraje.

Caracteríscas Agronómicas

Es un cultivar versátil que puede incluirse en todas las mezclas forrajeras.
Se combina muy bien con gramíneas perennes, cebadilla y raigrás anual, ya sea como única leguminosa de la mezcla o en combinación con trébol blanco y alfalfa.
La densidad de siembra recomendada es de entre 5 a 8 kg/ha, la fecha recomendada de siembra es a mediados del mes de marzo.
Tiene buena estabilidad productiva en diferentes ambientes agroecológicos, con excepción de los suelos superficiales.
Tolera situaciones de mal drenaje pero no anegamiento prolongado.

Pasture Genetics

ERRO SEMILLAS

ACHICORIA PG HAKA

- Achicoria Moderna, de hoja grande y tierna.
- Inducción reproductiva tardía.
- La solución perenne para producción de forraje de calidad en pleno verano.

Caracteríscas Agronómicas

Destacada adaptación a un rango amplio de tipos de suelo y ambientes.
Para siembras puras o en asociación con leguminosas y gramíneas. Densidad de siembra recomendada en siembra pura de 3 y 4 kg/ha y en pasturas mixtas 1,5 y 2,5 kg/ha.
Se recomienda en siembras de mediados de marzo en adelante.

Pasture Genetics

ERRO SEMILLAS

Plan de siembra

ESPECIE	TIPO	VARIEDAD	FEBRERO 1ª	FEBRERO 2ª	MARZO 1ª	MARZO 2ª	ABRIL 1ª	ABRIL 2ª	MAYO 1ª	MAYO 2ª	DENS. DE SIEMBRA KG/HÁ*
Avena byzantina	Pastoreo	ESTANZUELA 1095a									90 - 100
Avena sativa	Pastoreo / Cobertura	FRONTEIRA									60 - 70
Avena strigosa	CL, Pastoreo / Cobertura	IAPAR 61									45 - 55
Raigrás	Diploide corto	ESTANZUELA 284									20 - 25
LANZAMIENTO Raigrás	Tetraploide medio	PG CHIEF									20 - 25
Festuca	Tradicional	EST. TACUABE									18 - 20
Dactylis	Floración tardía	LE OBERÓN									6 - 10
Trébol blanco	Hoja grande	EST. ZAPICAN									1 - 3
Trébol rojo	Sin latencia	ESTANZUELA 116									5 - 8
NUEVO Trébol rojo	Sin latencia	PG BAQUEANO									5 - 8
Lotus corniculatus	Sin latencia	SAN GABRIEL									5 - 8
NUEVO Achicoria	Inducc. tardía y tallos huecos	PG HAKA									1 - 3
Alfalfa	Sin latencia, grupo 8	ESTANZUELA CHANA									15 - 20

(*) Sujeto a datos de PG y Coeficiente de logro.

Epoca de siembra optima

Epoca de siembra adecuada para planteos que persiguen la confección de reservas