




SEMILLAS





Semillas



aj
os



Soja

Todas las variedades son RR Roundup Ready 2 y su correspondiente logo es una marca registrada de Monsanto LLC. Monsanto y Genuity son marcas registradas y de titularidad de Monsanto NL.B.V. INTACTA RR2 PRO, Roundup y Roundup Ready son marcas registradas de titularidad de Monsanto Technology LLC. TM ® SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. Los eventos de soja transgénica en la soja Enlist E3® y Conkesta E3® son desarrollo y propiedad conjunta de Dow AgroSciences, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C. El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Dow AgroSciences, L.L.C., y ha sido desarrollado por esta misma compañía.

Ligate™ STS™
son marcas registradas de DUPON AGRO
(En trámite de inscripción).



INTACTA RR2 PRO

Conkesta E3



Enlist®
sistema de control
de malezas

DONMARIO
SEMILLAS

ERRO™



NUEVA

DM 64R64 STS

Grupo de madurez 6.2



I II III IV V.1 V.2



FS OPTIMA: I-II (5 de Noviembre - 5 de Diciembre)

FS OPTIMA: III-IV-V.1-V.2 (10 de Noviembre - 5 de Diciembre)

DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO

Nueva variedad que reemplaza a la reconocida DM 62R63 STS, por su incremento en productividad y mejoras agronómicas. Su GM VI corto le permite una gran versatilidad en FS para amplias zonas productivas de Uruguay.

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS



(1) Días de emergencia a R8:
152



Color Pub./
Color de Flor:
**Castaño claro /
Púrpura**



(1) Días a inicio PC (R3)
76



Peso Promedio de
**1000 Semillas (g)
167**



Altura
95



Potencial de ramificación
Alto



Comportamiento a Calcáreo
S/D



Vuelco
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerante Susceptible

Programa de I+D ERRO / (1) Fecha de siembra 15/11/25



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente



Mancha ojo de rana
Susceptible



DM 66R69 STS

Grupo de madurez 6.6



FS OPTIMA: I-II-III (20 de Octubre - 20 de Noviembre)

FS OPTIMA: IV-V.1-V.2 (25 de Octubre - 25 de Noviembre)

DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO

Variedad de ciclo VI largo con tecnología RR1, siendo una alternativa para iniciar el plan de siembra. Se destaca por su excelente porte agronómico y comportamiento productivo, combinando estabilidad y buen potencial de rendimiento en distintos ambientes.

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS



(1) Días de emergencia a R8:
156



Color Pub./
Color de Flor:
Gris / Blanca



(1) Días a inicio PC (R3)
82



Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
181



Altura
95



Potencial de ramificación
Alto



Comportamiento a Calcáreo
5



Vuelco
2



Programa de I+D ERRO / (1) Fecha de siembra 15/11/25



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente a raza 1 y 4



Mancha ojo de rana
**Moderadamente
Susceptible**



DM 60162 IPRO

Grupo de madurez 6.2

INTACTA RR2 PRO



I II III IV V.1 V.2



FS OPTIMA: I-II (5 de Noviembre - 5 de Diciembre)
FS OPTIMA: III-IV-V.1-V.2 (10 de Noviembre - 5 de Diciembre)

DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO

Variedad con tecnología Intacta, ampliamente validada en todos los ambientes productivos de Uruguay, combinando potencial y estabilidad de rendimiento.

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS



(1) Días de emergencia a R8:
151



Color Pub./
Color de Flor:
Gris / Púrpura



(1) Días a inicio PC (R3)
76



Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
167



Altura
110



Potencial de ramificación
Medio



Comportamiento a Calcáreo
9



Vuelco
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerante Susceptible

Programa de I+D ERRO / (1) Fecha de siembra 15/11/25



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Susceptible a raza 1




Mancha ojo de rana
Moderadamente
Susceptible



DM GARRA I PRO STS

Grupo de madurez 6.4

INTACTA RR2 PRO



DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO

Material de referencia para la zona Este del país, ampliamente validado por su adaptación y comportamiento productivo tanto en ambientes bajos como de loma. Una alternativa confiable para mantener buenos rendimientos en los sistemas característicos de la zona.



FS OPTIMA: III (20 de Octubre - 20 de Noviembre)

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS



(1) Días de emergencia a R8:
154



Color Pub./
Color de Flor:
Gris / Púrpura



(1) Días a inicio PC (R3)
78



Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
176



Altura
105



Potencial de ramificación
Medio-Alto



Comportamiento a Calcáreo
5



Vuelco
2



Programa de I+D ERRO / (1) Fecha de siembra 15/11/25



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Susceptible



Mancha ojo de rana
Resistente a raza 1



SIEMBRE REFUGIO DENTRO DE SU CAMPO

¿QUÉ SIGNIFICA SEMBRAR REFUGIO?

El Refugio es una porción de lote sembrado con una variedad de soja que no contenga el gen Bt, lo que permite que los insectos susceptibles puedan reproducirse y mantener una población susceptible numerosa capaz de diluir los posibles insectos “resistentes” sobrevivientes en INTACTA RR2 PRO y así mantener baja la frecuencia de insectos resistentes.

TAMAÑO DE REFUGIO Y DISPOSICIÓN CONCEPTOS BÁSICOS



REFUGIO 1200 metros

INTACTA RR2 PRO® Identifique el punto ● más alejado del campo INTACTA RR2 PRO® respecto de la chacra Refugio. No debe sobrepasar los 1200 metros. El porcentaje de refugio no debe ser menor al 20%.

- SIEMBRE UN 20% DE LA SUPERFICIE CON REFUGIO A NO MÁS DE 1200 METROS DE DISTANCIA DEL CULTIVO INTACTA RR2 PRO.
- PROTEJA SUS CHACRAS DE SOJA DEL ATAQUE DE INSECTOS SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS DEL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS.
- NO UTILICE INSECTICIDAS BT.

REFUGIO

IMPORTANTE:

DESTINE EL 20% DE LA SUPERFICIE PARA REFUGIO. DE ESTA MANERA PRESERVARÁ LA TECNOLOGÍA Y DISMINUIRÁ LA TASA DE APARICIÓN DE RESISTENCIA.

www.programamri.com



DM 46E25 STS

Grupo de madurez 4.6

Enlist E3®



DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO

Variedad ideal para explorar máximos rendimientos bajo riego. Su ciclo IV medio la posiciona como una excelente alternativa para siembras tempranas de octubre, donde expresa todo su potencial productivo. Incorpora tecnología **ENLIST**, aportando facilidad y flexibilidad para el control malezas.



OPTIMA: I-II (Siempre en ambientes regados)

ADAPTACIÓN: III-IV-V.1-V.2 (Siempre en ambientes regados)

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS



(1) Días de emergencia a R8:
135



Color Pub./
Color de Flor:
**Castaño claro /
Púrpura**



(1) Días a inicio PC (R3)
58



Peso Promedio de
**1000 Semillas (g)
168**



Altura
90



Potencial de ramificación
Alto



Comportamiento a Calcáreo
9



Vuelco
1



Programa de I+D ERRO / (1) Fecha de siembra 15/11/25



**Cancro del Tallo
Resistente**



**Phytophthora
Resistente a raza 1 y 4**



**Mancha ojo de rana
Resistente**



DM 50E25 STS

Grupo de madurez 5.2

Enlist E3®



DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO

Variedad ideal para maximizar rendimientos en ambientes de media a alta productividad y como alternativa para riego. Se posiciona para siembras desde mediados de noviembre en adelante, tanto para siembras de 1ra y 2da. Incorpora tecnología ENLIST, brindando mayor versatilidad para el manejo de malezas.



OPTIMA: I-II (Buenos ambientes de secano o riego)

ADAPTACIÓN: III-IV-V.1-V.2 (Siempre en ambientes regados)

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS



(1) Días de emergencia a R8:
138



Color Pub./
Color de Flor:
**Castaño claro /
Blanca**



(1) Días a inicio PC (R3)
62



Peso Promedio de
**1000 Semillas (g)
164**



Altura
100



Potencial de ramificación
Alto



Comportamiento a Calcáreo
7



Vuelco
2



Programa de I+D ERRO / (1) Fecha de siembra 15/11/25



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Susceptible



Mancha ojo de rana
Susceptible



DM 60E60 STS

Grupo de madurez 6.0

Enlist E3



I II III IV V.1 V.2

DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO

Material con tecnología Enlist, ampliamente validado en Uruguay. Combina excelente estabilidad, alto potencial de rendimiento y gran versatilidad para siembras de 1ra y 2da. Es la variedad de referencia del portfolio para suelos calcáreos.



FS OPTIMA: I-II (10 de Noviembre - 5 de Diciembre)

FS OPTIMA: III-IV-V.1-V.2 (15 de Noviembre - 5 de Diciembre)

CARACTERÍSTICAS AGRÓNOMICAS



(1) Días de emergencia a R8:
148



Color Pub./
Color de Flor:
Gris / Blanca



(1) Días a inicio PC (R3)
74



Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
171



Altura
110



Potencial de ramificación
Medio



Comportamiento a Calcáreo
2



Vuelco
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerante Susceptible

Programa de I+D ERRO / (1) Fecha de siembra 15/11/25



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente a raza 1 y 4



Mancha ojo de rana
Resistente



NUEVA

DM 60E62^{STS}

Grupo de madurez 6.0

Enlist E3[®]



DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO

La nueva DM 60E62 STS consolida la estabilidad y los máximos rendimientos de DM 60i62, incorporando tecnología ENLIST. Variedad reemplazo de DM 60E60 STS. Su ciclo VI corto le brinda gran versatilidad en distintas fechas de siembra, tanto de 1ra como de 2da.



FS OPTIMA: I-II (10 de Noviembre - 5 de Diciembre)
FS OPTIMA: III-IV-V.1-V.2 (15 de Noviembre - 5 de Diciembre)

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS



(1) Días de emergencia a R8:
148



Color Pub./
Color de Flor:
Gris / Blanca



(1) Días a inicio PC (R3)
74



Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
163



Altura
110



Potencial de ramificación
Medio



Comportamiento a Calcáreo
S/D



Vuelco
2



Programa de I+D ERRO / (1) Fecha de siembra 15/11/25



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Susceptible



Mancha ojo de rana
Susceptible



DM 64E64^{STS}

Grupo de madurez 6.7

Enlist E3[®]



DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO

La variedad de mayor potencial y estabilidad de rendimiento de su segmento que se adapta a distintos ambientes productivos, ideal para siembras de 1ra. Incorpora además tecnología ENLIST que brinda mayor versatilidad en el manejo de malezas.



FS OPTIMA: I-II-III (20 de Octubre - 20 de Noviembre)

FS OPTIMA: IV-V.1-V.2 (25 de Octubre - 25 de Noviembre)

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS



(1) Días de emergencia a R8:
156



Color Pub./
Color de Flor:
Gris / Púrpura



(1) Días a inicio PC (R3)
84



Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
186



Altura
105



Potencial de ramificación
Alto



Comportamiento a Calcáreo
3



Vuelco
3



Programa de I+D ERRO / (1) Fecha de siembra 15/11/25



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Susceptible



Mancha ojo de rana
Susceptible



DM 60K60 STS

Grupo de madurez 6.3

Conkesta E3



DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO

Variedad de alto potencial de rendimiento, recomendada para ambientes de media a alta productividad. Excelente alternativa para pivotes de segunda posición. Su bajo porte le confiere destacado comportamiento frente al vuelco, clave en planteos de alta productividad.



FS OPTIMA: I-II (5 de Noviembre - 5 de Diciembre)
FS OPTIMA: III-IV-V.1-V.2 (10 de Noviembre - 5 de Diciembre)

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS



(1) Días de emergencia a R8:
152



Color Pub./
Color de Flor:
Gris / Púrpura



(1) Días a inicio PC (R3)
76



Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
155



Altura
90



Potencial de ramificación
Muy Alto



Comportamiento a Calcáreo
5



Vuelco
1



Programa de I+D ERRO / (1) Fecha de siembra 15/11/25



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente a raza 1 y 4



Mancha ojo de rana
Susceptible



DM64K64STS

Grupo de madurez 6.8

Conkesta E3



I II III IV V.1 V.2

DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO

Excelente alternativa para iniciar el plan de siembra a fines de octubre en ambientes de productividad media. Su destacada adaptación a suelos calcáreos la posiciona como una opción de referencia para este tipo de planteos.



FS OPTIMA: I-II-III (20 de Octubre - 20 de Noviembre)
FS OPTIMA: IV-V.1-V.2 (25 de Octubre - 25 de Noviembre)

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS



(1) Días de emergencia a R8:
158



Color Pub./
Color de Flor:
Gris / Púrpura



(1) Días a inicio PC (R3)
86



Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
177



Altura
100



Potencial de ramificación
Alto



Comportamiento a Calcáreo
2



Vuelco
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerante Susceptible

Programa de I+D ERRO / (1) Fecha de siembra 15/11/25



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Susceptible



Mancha ojo de rana
Susceptible



NUEVA

DM 70K70^{STS}

Grupo de madurez 7.0

Conkesta E3



DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO

Excelente opción para iniciar el plan de siembra, que combina alto potencial de rendimiento y buena estabilidad.

Se destaca por presentar elevados pisos productivos, siendo una alternativa interesante especialmente para ambientes de zona norte y este del país en fechas de siembras tempranas.



FS OPTIMA: I-II-III (15 de Octubre - 15 de Noviembre)

FS OPTIMA: IV-V.1-V.2 (20 de Octubre - 20 de Noviembre)

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS



(1) Días de emergencia a R8:
162



Color Pub./
Color de Flor:
Gris / Púrpura



(1) Días a inicio PC (R3)
89



Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
165



Altura
90



Potencial de ramificación
Medio



Comportamiento a Calcareo
S/D



Vuelco
2



Programa de I+D ERRO / (1) Fecha de siembra 15/11/25



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Susceptible




Mancha ojo de rana
Susceptible



DISTRIBUCIÓN DEL REFUGIO PARA LOTE EN SOJA

La siembra del refugio deberá realizarse a una distancia máxima de 1.200m del área de Conkesta E3 y se puede sembrar siguiendo diferentes configuraciones. El porcentaje de refugio no deberá ser menor a 20%.



1.200 metros



Refugio (soja no Bt)



Soja Bt

Fuente: Programa MRI



REFUGIO

Programa de productividad sustentable

Asociación Semilleros Argentinos

Para maximizar la experiencia del Sistema Enlist®, se recomienda sembrar el refugio con variedades Enlist E3®. Ambas variedades (Conkesta E3® y refugio) deberán ser sembradas al mismo tiempo.

Es aconsejable limpiar la sembradora después de su uso para evitar mezclas inadvertidas de semillas Bt y no Bt. La siembra de semilla mezclada puede acelerar la aparición de resistencia.

No deberán utilizarse insecticidas a base de Bt en el área de refugio.

Podrá preservarse el refugio del daño por defoliación mediante aplicaciones de insecticidas cuando alcancen los niveles de daño económico recomendados para el grupo de madurez.

QUÉ ES EL EVENTO ENLIST?

El evento Enlist E3® le provee a la soja la tolerancia a los herbicidas:


- 2,4-D sal colina con tecnología Colex-D®.
- Glifosato.
- Glufosinato de amonio.

Este nuevo evento permite atacar la problemática de malezas sin dañar el cultivo de soja.

La soja Enlist E3® posibilita una ventana de aplicación de estos herbicidas amplia y flexible, permitiendo el diseño de programas de control muy completos y flexibles.

VENTANA DE APLICACIÓN

Trts residuales PS / PRE:
Glifosato + Auxinicos + Herbicidas residuales:
ALS / PPO / Triaz / Inh. Sint. Cel. / Inh. Div. Cel.
Flumioxazin / Sulfentrazone / Acetamidas
/ Pyroxasulone / Diclosulam.



Fecha de Siembra: 19 de OCTUBRE (DOLORES)



ZAFRA 2025/26

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	DDE (*)
DM 50E25 STS	9	50	30	20	35	24		159
DM 60E60 STS	9	72	72	14	33	35	12	166
NOUEVA DM 60E62 STS	9	72	72	14	33	35	12	166
NOUEVA DM 64R64 STS	9	74	74	12	35	35	15	171
DM 64E64 STS	9	77	77	17	34	32	15	175
NOUEVA DM 70K70 STS	9	79	79	18	33	33	16	179

■ SIEMBRA-EMERGENCIA ■ E-R1 ■ R1-R3 ■ R3-R5 ■ R5-R7 ■ R7-R8

DDE - R8(*) - Días desde Emergencia

Fecha de Siembra: 1 de NOVIEMBRE (DOLORES)



DONMARIO
SEMILLAS



SEMILLAS

ZAFRA 2025/26

	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	DDE (*)
DM 50E25 STS	7	50	23	16	37	27		153
DM 60E60 STS	7	68	13	25	35	15		156
DM 60E62 STS	7	68	13	25	35	15		156
DM 64R64 STS	7	73	10	25	37	16		161
DM 64E64 STS	7	77	14	26	33	14		164
DM 70K70 STS	7	79	15	26	33	15		168

■ SIEMBRA-EMERGENCIA ■ E-R1 ■ R1-R3 ■ R3-R5 ■ R5-R7 ■ R7-R8

DDE - R8(*) - Días desde Emergencia

Fecha de Siembra: 15 de NOVIEMBRE (DOLORES)



ZAFRA 2025/26

	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	DDE (*)
DM 50E25 STS	8	51	11	27	37	16		142
DM 60E60 STS	8	60	14	26	38	11		149
DM 60E62 STS	8	60	14	26	38	11		149
DM 64R64 STS	8	63	13	26	36	13		151
DM 64E64 STS	8	68	16	20	42	10		156
DM 70K70 STS	8	73	16	20	41	12		162

DDE - R8(*) - Días desde Emergencia



Fecha de Siembra: 3 de DICIEMBRE (DOLORES)



ZAFRA 2025/26

	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	DDE (*)
DM 50E25 STS	7	48	19	23	21			134
DM 60E60 STS	7	59	15	26	30	10		140
DM 60E62 STS	7	59	15	26	30	10		140
DM 64R64 STS	7	59	17	24	32	10		142
DM 64E64 STS	7	61	18	28	28	10		145
DM 70K70 STS	7	61	18	27	28	12		148

■ SIEMBRA-EMERGENCIA ■ E-R1 ■ R1-R3 ■ R3-R5 ■ R5-R7 ■ R7-R8

DDE - R8(*) - Días desde Emergencia

Fecha de Siembra: 18 de DICIEMBRE (DOLORES)



ZAFRA 2025/26

	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	DDE (*)
DM 50E25 STS	7	34	27	29	16	17		123
DM 60E60 STS	7	44	19	28	25	18		134
DM 60E62 STS	7	44	19	28	25	18		134
DM 64R64 STS	7	44	19	30	26	19		138
DM 64E64 STS	7	52	18	26	27	18		141
DM 70K70 STS	7	53	18	26	28	19		144

SIEMBRA-EMERGENCIA E-R1 R1-R3 R3-R5 R5-R7 R7-R8

DDE - R8(*) - Días desde Emergencia

Mai'iz



Maíz


Reservados todos los derechos. Maízgard, VT Triple PRO, Roundup Ready 2 y Trecepta y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.



IS 2773 VT3P

Madurez relativa 123

VT Triple PRO®



■ ALTA ■ MEDIA

DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO POR TECNOLOGÍA

Híbrido de amplia adaptación y destacado comportamiento en todo el rango ambiental. Se destaca en fechas de siembras tempranas por su capacidad de mantener altos pisos de rendimientos, con elevados techos productivos. **El más balanceado entre rendimiento y estabilidad productiva.**

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS



Ciclo Intermedio y simple.



Color de grano: Anaranjado



Días a Floración 74 (A) y 50 (B)



Peso de 1000 290



Altura de planta 239 cm



Intersección de espiga 94 cm



Vuelco 3



Quebrado 3



Green Snap 2



I+D ERRO - (A) Días a floración en FS temprana (2020/2024).
(B) Días a floración en FS tardía (2020/2024)



Roya 5



Tizón 3



Bacteriosis 3



Complejo del achaparramiento 4

SEMILLAS
ILLINOIS

ERRO
SEMILLAS

IS 2773 TRE

Madurez relativa 123

Trecepta®



■ ALTA ■ MEDIA

DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO POR TECNOLOGÍA

Híbrido de amplia adaptación y destacado comportamiento en todo el rango ambiental. Se destaca en fechas de siembras tempranas y tardías por su capacidad de mantener altos pisos de rendimientos con elevados techos productivos. **El más balanceado entre rendimiento y estabilidad productiva.**

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS



Ciclo
Intermedio y simple.



Color de grano:
Anaranjado



Días a Floración
74 (A) y 50 (B)



Peso de 1000
290



Altura de planta
239 cm



Intersección de espiga
94 cm



Vuelco
3



Quebrado
3



Green Snap
2



I+D ERRO - (A) Días a floración en FS temprana (2020/2024).
(B) Días a floración en FS tardía (2020/2024)



Roya
5



Tizón
3



Bacteriosis
3



Complejo del
achaparramiento
4

SEMILLAS
ILLINOIS

ERRO
SEMILLAS

NUEVO

IS 7.24 TRE

Madurez relativa 122

Trecepta®



■ ALTA ■ MEDIA

DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO POR TECNOLOGÍA

Híbrido que combina excelente potencial de rendimiento con una destacada estabilidad productiva. Se caracteriza por presentar una sobresaliente sanidad foliar y muy buen perfil agronómico, aportando rendimiento y consistencia en una amplia gama de ambientes.

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS



Ciclo Intermedio y simple.



Color de grano: Amarillo



Días a Floración 72 (A) y 50 (B)



Peso de 1000 320



Altura de planta 234 cm



Intersección de espiga 90 cm



Vuelco 2



Quebrado 2



Green Snap 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerante Susceptible

I+D ERRO - (A) Días a floración en FS temprana (2020/2024).
(B) Días a floración en FS tardía (2020/2024)



Roya 2



Tizón 3



Bacteriosis 1



Complejo del achaparramiento 4

SEMILLAS
ILLINOIS

ERRO
SEMILLAS

IS 799 TRE

Madurez relativa 122

Trecepta®



■ ALTA ■ MEDIA

DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO POR TECNOLOGÍA

Híbrido de alto potencial de rendimiento, recomendado para ambientes de máxima productividad y planteos de alta inversión tecnológica. Su excelente perfil agronómico, permite incrementar densidades y maximizar la respuesta al manejo. **Ideal para ambientes de riego y secano en ambas fechas de siembra.**

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS



Ciclo
Intermedio y simple.



Color de grano:
Anaranjado / Colorado



Días a Floración
72 (A) y 53 (B)



Peso de 1000
320



Altura de planta
227 cm



Intersección de espiga
90 cm



Vuelco
2



Quebrado
2



Green Snap
3



I+D ERRO - (A) Días a floración en FS temprana (2020/2024).
(B) Días a floración en FS tardía (2020/2024)



Roya
3



Tizón
2



Bacteriosis
3



Complejo del
achaparramiento
5


SEMILLAS
ILLINOIS

ERRO
SEMILLAS

IS 550 VT3P

Madurez relativa 104

VT Triple PRO®



■ ALTA ■ MEDIA

DESCRIPCIÓN Y POSICIONAMIENTO POR TECNOLOGÍA

Híbrido hiperprecoz que aporta una alternativa diferencial manteniendo buen potencial de rendimiento. Su ciclo corto permite anticipar cosecha en fechas tempranas, diversificar períodos críticos y generar esquemas de dobles cultivos en producción de silaje de planta entera.

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS



Ciclo
Hiperprecoz



Color de grano:
Amarillo



Días a Floración
68 (A)



Peso de 1000
270



Altura de planta
218 cm



Intersección de espiga
86 cm



Vuelco
3



Quebrado
3



Green Snap
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerante Susceptible

I+D ERRO - (A) Días a floración en FS temprana (2020/2024).
(B) Días a floración en FS tardía (2020/2024)



Roya
5



Tizón
4



Bacteriosis
4



Complejo del
achaparramiento
-

SEMILLAS
ILLINOIS

ERRO
SEMILLAS

MANEJO DE LA RESISTENCIA DE INSECTOS


ÁREA-REFUGIO: El refugio es una porción del lote sembrada, en la misma fecha, con un híbrido/variedad no Bt de similar ciclo de madurez que la del cultivo Bt.

Es una herramienta clave para disminuir la presión de selección de resistencia de insectos a las proteínas Bt.

El refugio funciona como reserva de insectos susceptibles, y permite que los insectos resistentes que pudieran sobrevivir sobre la porción Bt del lote, encuentren individuos susceptibles para cruzarse y generen descendencia susceptible, manteniendo baja la frecuencia de insectos resistentes. Si no hubiera refugio, los eventuales insectos resistentes seleccionados en el cultivo Bt se cruzarían entre ellos, aumentando rápidamente la frecuencia de insectos resistentes en la población.

La siembra de refugio es una BPA fundamental para todas las tecnologías Bt.

Para maíz se recomienda sembrar un bloque de refugio del 10% del total de la superficie del lote (9+1), de la siguiente manera:



FACTORES A TENER EN CUENTA AL SEMBRAR REFUGIOS

Sembrar el refugio con un maíz no Bt de ciclo similar, en el mismo momento que el resto del lote.

Para barrenador del tallo (*Diatraea saccharalis*) no realizar aplicaciones de insecticidas.

Para gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*) se pueden realizar aplicaciones de insecticidas si luego del monitoreo se observa un 20% de plantas con daño en nivel 3 de la escala de Davis. No se recomiendan más de dos aplicaciones y estas deben hacerse, preferentemente, hasta V6 -V8. No deberán utilizarse insecticidas a base de *Bacillus thuringiensis* (Bt) en el área de refugio.

Para mayor información visitar www.programamri.com.ar



CULTIVOS DE VERANO

CATÁLOGO

